

## MALATTIA INFETTIVA

### PERIODO MINIMO di ALLONTANAMENTO

- ✓ **Congiuntivite purulenta** Fino a 48 ore dopo l'inizio del trattamento.
- ✓ **Congiuntivite non purulenta** Fino a guarigione clinica.
- ✓ **Diaree infettive** Fino a 24 ore dopo l'ultima scarica diarroica e riammissione a "feci formate".
- ✓ **Herpes zoster (Fuoco di sant'Antonio)** Fino ad essiccamento delle vescicole.
- ✓ **Impetigine** Fino a 24 ore dopo l'inizio del trattamento(coprire le lesioni).
- ✓ **Influenza** Fino a guarigione clinica.
- ✓ **Morbillo** Fino a 5 giorni dalla comparsa dell'esantema.
- ✓ **Parotite epidemica** Fino a 9 giorni dalla comparsa della tumefazione parotidea.
- ✓ **Pediculosi** Fino al giorno successivo al trattamento.
- ✓ **Pertosse** Fino a 5 giorni dall'inizio del trattamento antibiotico. Fino a 3 settimane se non è stato eseguito.
- ✓ **Rosolia** Fino a 7 giorni dalla comparsa dell'esantema.

- ✓ **Scarlattina** Fino a 48 ore dopo l'inizio della terapia antibiotica.
- ✓ **Varicella** Fino a 5 giorni dall'inizio dell'eruzione e comunque fino a crostificazione delle lesioni.



**SI RACCOMANDA AI GENITORI DI ESSERE ATTENTI ALLE CONDIZIONI GENERALI DEL BAMBINO/A AL FINE DI GARANTIRE UNA FREQUENZA SERENA E RISPETTOSA DELL'INTERA COMUNITÀ'.**



## COMUNE DI VENEZIA

### Direzione Sviluppo

### Organizzativo, Risorse Umane e

### Sociale

### Servizi Educativi



**INFORMAZIONI GENERALI  
SUL "MANUALE PER LA  
PREVENZIONE DELLE  
MALATTIE INFETTIVE NELLE  
COMUNITÀ INFANTILI E  
SCOLASTICHE"**

Cari Genitori,  
dal 2011 la Regione Veneto ha provveduto ad aggiornare e rivedere la questione inerente la prevenzione delle malattie nelle comunità infantili e scolastiche. La stessa ha provveduto alla stesura e alla diffusione del “Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche.”

I servizi educativi del Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale,

devono attenersi a quanto stabilito nel manuale citato, che è presente in ogni Nido e Scuola dell’Infanzia e che potete visionare ogni qualvolta lo

riterrate utile.

Tuttavia abbiamo pensato, vista la consistenza del manuale, di stendere un piccolo “riassunto” di seguito riportato, di quelle che noi riteniamo essere le informazioni per voi più utili.

Le malattie infettive costituiscono uno dei principali problemi di sanità pubblica ed i più colpiti sono proprio i bambini per il loro sistema immunitario ancora immaturo ma anche perché la socializzazione

tra bambini favorisce la diffusione di agenti patogeni. Per un efficace controllo delle malattie infettive nelle comunità è necessaria una corretta comunicazione e collaborazione tra tutti gli



attori: operatori sanitari, genitori, insegnanti, responsabili della collettivi

I genitori non devono accompagnare il figlio al nido o a scuola **quando presenta sintomi di malattia quali febbre a 38°C o più, vomito, diarrea, manifestazioni cutanee, congiuntivite, parassitosi. Nel caso in cui il bambino durante la frequenza presenti sintomi di malattia il personale provvederà ad informare i genitori ed il Responsabile del servizio che provvederà a disporre l’allontanamento del bambino dalla comunità.**

Misure particolari di allontanamento e riammissione potranno essere previste in caso di epidemia nella comunità.

Sarebbe auspicabile che in caso di malattia infettiva i genitori comunicassero al nido o alla scuola la diagnosi effettuata dal curante per permettere di attivare misure di prevenzione.

Non è più richiesto il certificato medico per il rientro. Il genitore dovrà compilare un modulo di autodichiarazione che attesti di essersi attenuto alle indicazioni del curante per il rientro in collettività.

In linea generale per la riammissione alla frequenza non è sufficiente l’assenza di sintomi di malattia ma è necessario che il **bambino si sia ristabilito al punto da poter svolgere adeguatamente le attività scolastiche.**



Non vi sono controindicazioni alla frequenza per i bambini che portano apparecchi gessati, ortopedici, protesici o presentano punti di sutura.

<p><b><u>Si ricorda che in caso di allontanamento per febbre o malessere, il bambino deve rimanere a casa almeno 24 ore. Quindi non potrà rientrare il giorno dopo.</u></b></p>
---